



КОРОЛЕВА АННА



Среднеранний, преимущественно неразвариваемый гомогенный сорт столового картофеля с отличными свойствами кожуры. Возможно получить высокие урожаи товарного картофеля фракций 35/60. Несмотря на раннее созревание, сорт способен отлично храниться. КОРОЛЕВА АННА устойчива к вирусам Y и Y-ntn, а также ризоктониозу, фомозу (чёрной пятнистости), парше обыкновенной и серебристой, железистой пятнистости, альтернариозу. Сорт устойчив к раку картофеля типа 1 и картофельным нематодам Ro 1, 4.

РАСТЕНИЕ

Форма роста	Прямостоячая
Тип роста	Стеблевой
Высота	Средней высоты
Развитие в начальной стадии	Стремительное
Окраска цветка	Белая
Количество клубней, шт.	14-16

СВОЙСТВА КЛУБНЕЙ

Цвет кожуры	Жёлтый
Структура кожиры	Гладкая
Цвет мякоти	Желтый
Форма клубней	Удлинённо-ovalная
Глубина глазков	Поверхностная
Период покоя	Очень длительный

УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ

	Ro 1, Ro 4
Нематода	Race 1
Рак картофеля	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Фитофтороз	● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○
Ризоктониоз	● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○
Чёрная ножка	● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○
Парша обыкновенная	● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○
Вторичный рост	● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○
Парша серебристая	● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○
Механические повреждения	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
Появление чёрных пятен (bruising)	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
Y-вирус	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
Засухоустойчивость	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○

Оценка в баллах: 0 – очень чувствителен, 10 – высокоустойчив

УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО

Назначение	Столовый, мойка, чистка, для упаковки	Содержание крахмала, %	13 – 15
Дней от всходов	75 – 85	Потемнение при варке	Слабое
Урожайность, т/га	50 – 65	Потемнение мякоти	Слабое
		Вкусовые качества	Отличные, кулинарный тип В

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Подготовка к посадке:

Требуется обязательная обработка от ризоктониоза, на черноземных почвах и при большом количестве растительных остатков проправливание почвы предпочтительнее

Густота посадки,

фракция 35–55 мм, шт./га:
45 000 – 50 000

Глубина посадки: На 2–3 см глубже, чем обычна, высота гребней 18 см над клубнем. Обязательнорыхление ниже заделки клубней минимум на 15 см

Доза внесения удобрений, кг д.в./га (для среднебеспеченных почв):

N130 P100 K260

Чувствительность к гербицидам при внесении по всходам:

Не чувствителен

Особенности уборки:

Бережная

**Рекомендуемые зоны
возделывания:** Повсеместно, на черноземных почвах для получения качества, пригодного на мойку, необходим полив

Другие особенности:

Не рекомендуется обламывание апикального ростка, посадка в оптимально тёплую почву, семенной картофель хранить при температуре не ниже 3–4 °C.

Удаление ботвы по схеме: 1 л/га Реглон, через 5 дн. ботвоудаление, через 7 дн. 1 л/га Реглон.

От удаления ботвы до уборки должно пройти не менее 2 недель, не убирать в жаркую погоду