



Среднеранний, столовый картофель с очень высоким выходом товарного урожая и превосходными вкусовыми качествами. Сорт обладает красивой кожурой, привлекательной жёлтой окраской клубней и мякоти, а также выровненной фракцией. Стоит отметить его высокую устойчивость к ризиктониозу, серебристой парше, гнили клубней, дуплистости, альтернариозу, механическим повреждениям, фомозу (чёрной пятнистости), и, прежде всего, к железистой пятнистости. При посадке следует выдерживать большие расстояния между клубнями, иначе возможен высокий выход мелких клубней.

РАСТЕНИЕ

Форма роста	Полупрямоствоячая
Тип роста	Промежуточный
Высота	Средней высоты до высокого
Развитие в начальной стадии	Среднее
Окраска цветка	Белая
Количество клубней, шт.	более 15

СВОЙСТВА КЛУБНЕЙ

Цвет кожуры	Жёлтый
Структура кожуры	Сетчатая
Цвет мякоти	Темно-жёлтый
Форма клубней	Округло-овальная
Глубина глазков	Поверхностная
Период покоя	Средний, длительный

УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ

Нематода	Ro 1, 4									
	Race 1*									
Рак картофеля	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фитофтороз	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ризиктониоз	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Чёрная ножка	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Парша обыкновенная	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Вторичный рост	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Парша серебристая	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Механические повреждения	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Появление чёрных пятен (bruising)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
У-вирус	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Засухоустойчивость	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

* Оказался устойчивым в одной стране ЕС
Оценка в баллах: 0 – очень чувствителен, 10 – высокоустойчив

УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО

Назначение	Столовый, мойка, чистка, для упаковки	Содержание крахмала, %	12 – 13
Дней от всходов	85 – 90	Потемнение при варке	Очень слабое
Урожайность, т/га	60 – 65	Потемнение мякоти	Слабое
		Вкусовые качества	Отличные, кулинарный тип ВС

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Подготовка к посадке:
 Несмотря на высокую устойчивость, требуется обработка от ризиктониоза

Густота посадки, фракция 35–55 мм, шт/га:
 38 000 – 40 000

Глубина посадки: Обычная

Доза внесения удобрений, кг д.в./га (для среднеобеспеченных почв):
 N120 P100 K300 (50 кг/га азота до посадки в виде сульфата аммония, 70 кг/га до смыкания рядков)

Чувствительность к гербицидам при внесении по всходам:
 Не чувствителен

Особенности уборки: Бережная

Другие особенности:
 Уборка только после формирования прочной кожуры, чувствителен к фитофторозу, требует ранних профилактических обработок против фитофтороза

Рекомендуемые зоны возделывания:
 Повсеместно, предпочтительны лёгкие и средние по гранулометрическому составу почвы, требуется полив или достаточное увлажнение