

ОПАЛ



РАСТЕНИЕ

Форма роста	Полупрямостоячая
Тип роста	Стеблевой
Высота	Средней высоты до высокого
Развитие в начальной стадии	Быстрое
Окраска цветка	Красно-фиолетовая
Количество клубней, шт.	15 – 18

СВОЙСТВА КЛУБНЕЙ

Цвет кожуры	Жёлтый
Структура кожуры	Сетчатая
Цвет мякоти	Кремовый
Форма клубней	Округло-овальная
Глубина глазков	Средняя
Период покоя	Очень длительный

УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ

Нематода	Ro 1, 4
Рак картофеля	Race 1*
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Фитофтороз	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Ризоктониоз	● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○
Чёрная ножка	● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○
Парша обыкновенная	● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○
Вторичный рост	● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○
Механические повреждения	● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○
Появление чёрных пятен (bruising)	● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○
Y-вирус	● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○
Засухоустойчивость	● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○

* Оказался устойчивым в одной стране ЕС

Оценка в баллах: 0 – очень чувствителен, 10 – высокоустойчив

УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО

Назначение	Чипсовый, переработка на сухое картофельное пюре
Дней от всходов	80 – 90
Урожайность, т/га	45 – 50

Содержание крахмала, %	16 – 18
Вкусовые качества чипсов:	
- после уборки	Очень хорошие
- после длительного хранения	Очень хорошие
- после хранения при низких температурах	Очень хорошие

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Подготовка к посадке:

Прорашивание семенного материала при достаточном наличии света позволяет получать ранние урожаи

Густота посадки, фракция 35–55 мм, шт/га:
44 500 – 45 500

Глубина посадки: Обычная

**Доза внесения удобрений, кг д.в./га
(для среднеобеспеченных почв):**

N90 P120 K240

**Чувствительность к гербицидам
при внесении по всходам:**

Не чувствителен

Особенности уборки: Бережная

Другие особенности:

Для обеспечения хорошего длительного хранения рекомендуется убирать при образовании плотной кожуры, удаление ботвы проводить в ранние сроки

Рекомендуемые зоны возделывания: Повсеместно