

БЕЛЬМОНДА



РАСТЕНИЕ

Форма роста	Полупрямостоячая
Тип роста	Промежуточный
Высота	Средней высоты до высокого
Развитие в начальной стадии	Быстрое
Окраска цветка	Красно-фиолетовая
Количество клубней, шт.	15-18

СВОЙСТВА КЛУБНЕЙ

Цвет кожуры	Жёлтый
Структура кожуры	Гладкая
Цвет мякоти	Жёлтый
Форма клубней	Округло-овальная
Глубина глазков	Поверхностная
Период покоя	Очень длительный

УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ

Нематода	Ro 1,4
Рак картофеля	Race 1
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Фитофтороз	●●●●●●●●●●
Ризиктониоз	●●●●●●●●●●
Чёрная ножка	●●●●●●●●●●
Парша обыкновенная	●●●●●●●●●●
Вторичный рост	●●●●●●●●●●
Парша серебристая	●●●●●●●●●●
Механические повреждения	●●●●●●●●●●
Появление чёрных пятен (bruising)	●●●●●●●●●●
Y-вирус	●●●●●●●●●●
Засухоустойчивость	●●●●●●●●●●

Оценка в баллах: 0 – очень чувствителен, 10 – высокоустойчив

УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО

Назначение	Столовый, мойка, чистка, для упаковки	Содержание крахмала, %	14–16
Дней от всходов	85 – 90	Потемнение при варке	Слабое
Урожайность, т/га	50 – 65	Потемнение мякоти	Слабое
		Вкусовые качества	Отличные, кулинарный тип В

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Подготовка к посадке:

Рекомендуется вентиляция тёплым воздухом, прогрев, обработка против ризиктониоза

Густота посадки, фракция 35–55 мм, шт/га:
40 000–44 000

Глубина посадки: Обычная

Доза внесения удобрений, кг д.в./га (для среднеобеспеченных почв):

N120, P100, K300 + внесение азота в два приема

Чувствительность к гербицидам при внесении по всходам:

Не чувствителен к метрибузину

Особенности уборки: Бережная

Другие особенности:

Уборка только после формирования прочной кожуры, сорт способен к длительной вегетации, сохраняет зеленую ботву до конца сентября, чувствителен к альтернариозу

Зарегистрированы в Госреестрах: Россия, Беларусь