



РАСТЕНИЕ

Форма роста	Полупрямостоячая
Тип роста	Листовой
Высота	Средней высоты до высокого
Развитие в начальной стадии	Быстрое
Окраска цветка	Красно-фиолетовая
Количество клубней, шт.	14-18

СВОЙСТВА КЛУБНЕЙ

Цвет кожуры	Красный
Структура кожуры	Гладкая
Цвет мякоти	Жёлтый
Форма клубней	Удлиненно-овальная
Глубина глазков	Поверхностная
Период покоя	Длительный

УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ

Нематода	Ro 1, Ro 4									
	Race 1									
Рак картофеля	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фитофтороз	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ризиктониоз	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Чёрная ножка	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Парша обыкновенная	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Вторичный рост	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Парша серебристая	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Механические повреждения	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Появление чёрных пятен (bruising)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Y-вирус	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Засухоустойчивость	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Оценка в баллах: 0 – очень чувствителен, 10 – высокоустойчив

УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО

Назначение	Столовый, мойка, чистка, для упаковки	Содержание крахмала, %	15 – 17
Дней от всходов	70 – 80	Потемнение при варке	Слабое
Урожайность, т/га	50 – 60	Потемнение мякоти	Слабое
		Вкусовые качества	Отличные, кулинарный тип В

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Подготовка к посадке:

Прогреть клубни перед посадкой. Желательна обработка от ризиктониоза

Особенности уборки:

Бережная

Глубина посадки:

На 2-3 см глубже, чем обычная, высота гребней 18 см над клубнем. Обязательно Рыхление ниже заделки клубней минимум 15 см

Доза внесения удобрений, кг д.в./га (для среднеобеспеченных почв):

N100, P100, K300

Чувствительность к гербицидам при внесении по всходам:

Не чувствителен к метрибузину

Густота посадки, фракция 35–55 мм, шт/га:

48 000

Другие особенности:

Рекомендуется уборка при сухой тёплой погоде или просушивание клубней перед закладкой на хранение, не превышать дозу азота, строго соблюдать густоту посадки, быстро охладить для хранения

Зарегистрированы в Госреестрах: Россия, Казахстан, Беларусь, Узбекистан