



ЛИЛЛИ



Среднеранний, столовый картофель с очень высоким выходом товарного урожая и превосходными вкусовыми качествами. Сорт обладает красивой кожурой, привлекательной жёлтой окраской клубней и мякоти, а также выровненной фракцией. Стоит отметить его высокую устойчивость к ризиктониозу, серебристой парше, гнили клубней, дуплистости, альтернариозу, механическим повреждениям, фомозу (чёрной пятнистости), и, прежде всего, к железистой пятнистости.

РАСТЕНИЕ

Форма роста	Полупрямостоячая
Тип роста	Промежуточный
Высота	Средней высоты до высокого
Развитие в начальной стадии	Среднее
Окраска цветка	Белая
Количество клубней, шт.	16-20

СВОЙСТВА КЛУБНЕЙ

Цвет конуры	Жёлтый
Структура конуры	Сетчатая
Цвет мякоти	Тёмно-жёлтый
Форма клубней	Округло-овальная
Глубина глазков	Поверхностная
Период покоя	Средний, длительный

УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ

Нематода	Ro 1, 4									
	Race 1*									
Рак картофеля	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фитофтороз	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Ризиктониоз	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Чёрная ножка	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Парша обыкновенная	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Вторичный рост	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Парша серебристая	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Механические повреждения	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Появление чёрных пятен (bruising)	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○
У-вирус	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Засухоустойчивость	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○

* Оказался устойчивым в одной стране ЕС
 Оценка в баллах: 0 – очень чувствителен, 10 – высокоустойчив

УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО

Назначение	Столовый, мойка, чистка, для упаковки	Содержание крахмала, %	12 – 14
Дней от всходов	80 – 90	Потемнение при варке	Очень слабое
Урожайность, т/га	55 – 65	Потемнение мякоти	Слабое
		Вкусовые качества	Отличные, кулинарный тип ВС

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Подготовка к посадке:

Несмотря на высокую устойчивость, требуется обработка от ризиктониоза

Густота посадки, фракция 35–55 мм, шт/га:
38 000 – 40 000

Глубина посадки: Обычная

Доза внесения удобрений, кг д.в./га (для среднеобеспеченных почв):

N140, P100, K300

Чувствительность к гербицидам при внесении по всходам:

Не чувствителен к метрибузину

Особенности уборки: Бережная

Другие особенности:

Уборка только после формирования прочной конуры, чувствителен к фитофторозу, требует ранних профилактических обработок против фитофтороза

Зарегистрированы в Госреестрах:
Россия