



Среднеранний сорт картофеля, для переработки на чипсы и сухие порошковые продукты. ОПАЛ отлично хранится даже при холодных температурах (4°C). Высокая устойчивость против фитофтороза, чёрной ножки, вируса Y и железистой пятнистости, а также против засухи.

РАСТЕНИЕ

Форма роста	Полупрямостоячая
Тип роста	Стеблевой
Высота	Средней высоты до высокого
Развитие в начальной стадии	Быстрое
Окраска цветка	Красно-фиолетовая
Количество клубней, шт.	15 – 18

СВОЙСТВА КЛУБНЕЙ

Цвет кожуры	Жёлтый
Структура кожуры	Сетчатая
Цвет мякоти	Кремовый
Форма клубней	Округло-овальная
Глубина глазков	Средняя
Период покоя	Очень длительный

УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ

Нематода	Ro 1, 4									
	Race 1*									
Рак картофеля	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фитофтороз	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Ризиктониоз	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Чёрная ножка	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Парша обыкновенная	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Вторичный рост	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Механические повреждения	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Появление чёрных пятен (bruising)	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Y-вирус	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Засухоустойчивость	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●

* Оказался устойчивым в одной стране ЕС
Оценка в баллах: 0 – очень чувствителен, 10 – высокоустойчив

УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО

Назначение	Чипсовый, переработка на сухое картофельное пюре	Содержание крахмала, %	16 – 18
Дней от всходов	80 – 90	Вкусовые качества чипсов:	
Урожайность, т/га	45 – 50	- после уборки	Очень хорошие
		- после длительного хранения	Очень хорошие
		- после хранения при низких температурах	Очень хорошие

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Подготовка к посадке:

Проращивание семенного материала при достаточном наличии света позволяет получать ранние урожаи. Избегать ранней посадки и обламывания ростков

Густота посадки, фракция 35–55 мм, шт/га:
42 000 – 46 000

Глубина посадки: Обычная

Доза внесения удобрений, кг д.в./га (для среднеобеспеченных почв):

N140, P120, K300

Чувствительность к гербицидам при внесении по всходам:

Чувствителен к метрибузину

Особенности уборки: Бережная

Другие особенности:

Для обеспечения хорошего длительного хранения рекомендуется убирать при образовании плотной кожуры, удаление ботвы проводить в ранние сроки

Зарегистрированы в Госреестрах: Россия, Беларусь