



ПРАДА



Суперранний, высокоурожайный столовый картофель с очень гладкой, ярко-желтой кожурой и светло-желтой мякотью. Устойчив к нематодам Ro 1, 4, Pa2. Пригоден для домашнего производства картофеля фри. Отличается очень выровненными крупными клубнями.

РАСТЕНИЕ

Форма роста	Полупрямостоячая
Тип роста	Промежуточный
Высота	Средней высоты
Развитие в начальной стадии	Интенсивное
Окраска цветка	Белая
Количество клубней, шт.	12-14

СВОЙСТВА КЛУБНЕЙ

Цвет кожуры	Жёлтый
Структура кожуры	Гладкая
Цвет мякоти	Светло-жёлтый
Форма клубней	Овальная
Глубина глазков	Поверхностная
Период покоя	Средний

УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ

Нематода	Ro 1, Ro 4, Pa 2 (8)									
	Race 1									
Рак картофеля	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фитофтороз	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ризиктониоз	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Чёрная ножка	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Парша обыкновенная	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Вторичный рост	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Парша серебристая	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Механические повреждения	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Появление чёрных пятен (bruising)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
У-вирус	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Засухоустойчивость	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Оценка в баллах: 0 – очень чувствителен, 10 – высокоустойчив

УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО

Назначение	Столовый, мойка, чистка, для упаковки	Содержание крахмала, %	11 – 14
Дней от всходов	55 – 65	Потемнение при варке	Незначительное
Урожайность, т/га	45 – 50	Потемнение мякоти	Незначительное
		Вкусовые качества	Хорошие, кулинарный тип В

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Подготовка к посадке:

Требуется посадка в оптимально ранние сроки

Густота посадки, фракция 35–55 мм, шт/га:

44 000 – 45 000

Глубина посадки: Обычная

Доза внесения удобрений, кг д.в./га

(для среднеобеспеченных почв):
N130 P120 K220

Чувствительность к гербицидам при внесении по всходам:

Чувствителен к метрибузину

Зарегистрированы в Госреестрах:

Россия, Беларусь

Особенности уборки:

Бережная, для механизированной уборки требуется формирование ростка, в случае вынужденного удаления ботвы 2 недели после удаления ботвы

Другие особенности:

Не рекомендуется обламывание апикального ростка, в случае вынужденного обламывания, просушить перед посадкой 3-4 дня.