



# КОРОЛЕВА АННА



Среднеранний, преимущественно неразвариваемый однородный сорт столового картофеля с очень гладкой кожурой. Возможно получить высокие урожаи товарного картофеля фракций 50/60. Устойчив к вирусам Y и Y-ntn, а также ризиктониозу, фомозу (чёрной пятнистости), парше обыкновенной и серебристой, железистой пятнистости, альтернариозу. Сорт устойчив к раку картофеля типа 1 и картофельным нематодам Ro 1,4.

## РАСТЕНИЕ

Форма роста	Прямостоячая
Тип роста	Стеблевой
Высота	Средней высоты
Развитие в начальной стадии	Стремительное
Окраска цветка	Белая
Количество клубней, шт.	15–18

## СВОЙСТВА КЛУБНЕЙ

Цвет кожуры	Жёлтый
Структура кожуры	Гладкая
Цвет мякоти	Жёлтый
Форма клубней	Удлиненно-овальная
Глубина глазков	Поверхностная
Период покоя	Очень длительный

## УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ

Нематода	Ro 1, Ro 4									
	Race 1									
Рак картофеля	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фитофтороз	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
Ризиктониоз	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
Чёрная ножка	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
Парша обыкновенная	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Вторичный рост	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
Парша серебристая	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Механические повреждения	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Появление чёрных пятен (bruising)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
Y-вирус	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
Засухоустойчивость	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○

Оценка в баллах: 0 – очень чувствителен, 10 – высокоустойчив

## УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО

Назначение	Столовый, мойка, чистка, для упаковок	Содержание крахмала, %	13 – 15
Дней от всходов	75 – 85	Потемнение при варке	Слабое
Урожайность, т/га	50 – 65	Потемнение мякоти	Слабое
		Вкусовые качества	Отличные, кулинарный тип В

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

### Подготовка к посадке:

Требуется обязательная обработка от ризиктониоза, на черноземных почвах и при большом количестве растительных остатков протравливание почвы предпочтительнее

**Густота посадки, фракция 35–55 мм, шт/га:**  
45 000 – 50 000

**Глубина посадки:** На 2–3 см глубже, чем обычная, высота гребней 18 см над клубнем. Обязательно рыхление ниже заделки клубней минимум на 15 см

**Доза внесения удобрений, кг д.в./га (для среднеобеспеченных почв):**  
N100, P100, K300

**Чувствительность к гербицидам при внесении по всходам:**  
Не чувствителен к метрибузину

**Особенности уборки:** Бережная

**Зарегистрированы в Госреестрах:**  
Россия, Беларусь, Казахстан, Узбекистан

### Другие особенности:

Не рекомендуется обламывание апикального роста, посадка в оптимально тёплую почву, семенной картофель хранить при температуре не ниже 3–4 °С.

От удаления ботвы до уборки должно пройти не менее 2 недель, не убирать в жаркую погоду