



ВЕРДИ



РАСТЕНИЕ

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Форма роста | Прямостоячая до полупрямостоячей |
| Тип роста | Промежуточный |
| Высота | Средней высоты до высокой |
| Развитие в начальной стадии | Быстрое |
| Окраска цветка | Красно-фиолетовая |
| Количество клубней, шт. | 14-16 |

СВОЙСТВА КЛУБНЕЙ

| | |
|------------------|------------------|
| Цвет конуры | Жёлтый |
| Структура конуры | Сетчатая |
| Цвет мякоти | Кремовый |
| Форма клубней | Округло-овальная |
| Глубина глазков | Средняя |
| Период покоя | Очень длительный |

УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ

| Нематода | Ro 1,4 | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| | Race 1* | | | | | | | | | |
| Рак картофеля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Фитофтороз | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| Ризиктониоз | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| Чёрная ножка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| Парша обыкновенная | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| Вторичный рост | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| Механические повреждения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| Появление чёрных пятен (bruising) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| У-вирус | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Засухоустойчивость | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |

* Оказался устойчивым в одной стране ЕС
Оценка в баллах: 0 – очень чувствителен, 10 – высокоустойчив

УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО

| | | | |
|-------------------|---|--|---------------|
| Назначение | Чипсовый, переработка на сухое картофельное пюре, крахмал | Содержание крахмала, % | 19-22 |
| Дней от всходов | 90 – 110 | Вкусовые качества чипсов: | |
| Урожайность, т/га | 30 – 40 | - после уборки | Очень хорошие |
| | | - после длительного хранения | Очень хорошие |
| | | - после хранения при низких температурах | Очень хорошие |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Подготовка к посадке:

Рекомендуется проращивание и удаление апикальных ростков. Сорт характеризуется быстрым развитием ботвы

Густота посадки, фракция 35-55 мм, шт/га:
39 000-55 000

Глубина посадки: Обычная

Доза внесения удобрений, кг д.в./га (для среднеобеспеченных почв):

N150, P100, K280

Чувствительность к гербицидам при внесении по всходам:

Чувствителен к метрибузину

Особенности уборки: Бережная

Другие особенности:

Формирует мощную ботву, требуется дробное химическое удаление ботвы

Зарегистрированы в Госреестрах:
Россия