



РОДРИГА



РАСТЕНИЕ

Форма роста	Полупрямостоячая
Тип роста	Промежуточный
Высота	Средней высоты до высокого
Развитие в начальной стадии	Среднее
Окраска цветка	Красно-фиолетовая
Количество клубней, шт.	15 - 17

СВОЙСТВА КЛУБНЕЙ

Цвет кожуры	Красный
Структура кожуры	Гладкая
Цвет мякоти	Светло-жёлтый
Форма клубней	Овальная
Глубина глазков	Поверхностная
Период покоя	Средний, длительный

УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ

Нематода	Ro 1, 4
Рак картофеля	Race 1
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Фитофтороз	●●●●●●●●●●
Ризиктониоз	●●●●●●●●●●
Чёрная ножка	●●●●●●●●●●
Парша обыкновенная	●●●●●●●●●●
Механические повреждения	●●●●●●●●●●
Появление чёрных пятен (bruising)	●●●●●●●●●●
У-вирус	●●●●●●●●●●
Засухоустойчивость	●●●●●●●●●●

Оценка в баллах: 0 – очень чувствителен, 10 – высокоустойчив

УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО

Назначение	Столовый, мойка, чистка, для упаковки	Содержание крахмала, %	16 – 18
Дней от всходов	80 – 85	Потемнение при варке	Слабое
Урожайность, т/га	45 – 60	Потемнение мякоти	Слабое
		Вкусовые качества	Отличные, кулинарный тип В

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Подготовка к посадке:

Благодаря средне-быстрому, мощному и равномерному развитию ботвы в начальной стадии сорт не требует никакой дополнительной подготовки семян

Густота посадки, фракция 35–55 мм, шт/га:
41 000 – 46 000

Глубина посадки: Обычная

Доза внесения удобрений, кг д.в./га (для среднеобеспеченных почв):

N140 P100 K280, азот в 2 приема

Чувствительность к гербицидам при внесении по всходам:

Не чувствителен

Особенности уборки: Бережная

Другие особенности:

В южных регионах и при продолжительной засухе возможно вторичное клубнеобразование. Необходимо достаточное обеспечение влагой. При уборке должна быть получена физиологическая спелость клубней

Рекомендуемые зоны возделывания:

Севернее 53-й широты