



АРОЗА – очень ранний, столовый, преимущественно не развариваемый сорт, пригодный для переработки на картофель фри. Сорту свойственны высокая урожайность, а также устойчивость к парше, ризоктонии, клубневой гнили, черной ножке, Y-вирусу, нематоде и раку картофеля. Ароза образует клубни с гладкой кожурой и привлекательным желтым цветом мякоти.

Растение

Группа спелости	очень ранняя
Дней от посадки	90 – 100 дней
Дней от всходов	75 – 80 дней
Тип роста	средний
Форма роста	полу-прямостоячая
Окраска цветка	красно-фиолетовая
Развитие в начальной стадии	быстрое
Количество клубней	Выше среднего, 10-14 клубней
Продолжительность периода покоя	Выше среднего

Устойчивость

Нематода	Ro 1, 4, 5
Рак картофеля	Pathotyp 1
Гниль ботвы, листьев	высокая - 8
Гниль клубней	высокая - 8
Парша	выше средней - 7
Ризоктония	средняя - 7
Черная ножка	высокая – 6,5-7
Железистая пятнистость	высокая - 8
Повреждения	выше средней - 7
Появление черных пятен	средняя - 7
Y-Вирус	очень высокая - 10
Вирус скручивания листьев	ниже средней - 5

Свойства клубней

Форма клубней	овальная
Цвет мякоти	желтый
Глубина залегания глазков	средняя
Цвет кожуры	красный/светло-красный
Структура кожуры	гладкая
Хранение: продовольственный картофель	до февраля – марта, очень ранний сорт, не пригоден для длительного хранения
Хранение: семенной картофель	чем больше внесение калия, тем больше срок хранения

Урожайность и качество

Назначение	Столовый картофель, картофель фри
Урожайность	выше средней 40 – 50 т/га
Доля крупных клубней	средняя – 20-30 %
Доля мелких клубней	средняя – 5 %
Развариваемость	слабая
Потемнение при варке	слабое
Потемнение мякоти	слабо-среднее
Крахмалистость	низко-средняя (14%)

Оценка в баллах: 1 – очень плохо, 10 – очень хорошо

Вышеизложенная информация подготовлена на основании наших знаний и компетенций, но так как картофель является природным продуктом, мы не можем нести ответственность за конечный результат