



РОДРИГА – ранний, преимущественно не развариваемый, столовый сорт с кожурой красного цвета. Наряду с высокой урожайностью, данный сорт имеет красивые, выровненные овальные товарные клубни с очень поверхностным залеганием глазков. Преимуществом по сравнению с другими сортами является превосходная устойчивость к заражению паршой, фитофторой, черной ножкой, ризоктонией, черными пятнами и ржавчиной, Y-вирусом, раком типа 1 и нематодами Ro 1,4.

Растение

Группа спелости	ранняя
Дней от посадки	95-100 дней
Дней от всходов	80-85 дней
Тип роста	промежуточный тип
Форма куста	прямостоячая
	полупрямостоячая
Окраска цветка	красно-фиолетовая
Развитие на	
начальной стадии	среднее
Количество клубней	среднее, 15-17 штук
Продолжительность периода покоя	прямостоячая
Хранение	средняя-высокая
	использовать до мая, июня (в охлажденном хранилище)

Устойчивость

Нематода	Ro 1, 4
Рак картофеля	Pathotyp 1
Гниль ботвы/листьев	выше средней, 7-8
Гниль клубней	высокая, 8
Парша	высокая, 8
Ризоктониоз	высокая, 8
Черная ножка	высокая, 8
Ржавчина	высокая, 8
Повреждения	высокая, 8
Черная пятнистость	очень высокая, 9
Y-Вирус	высокая, 7-8
Y-ntn Вирус	высокая, 9

Свойства клубней

Форма клубней	овальная
Окраска мякоти	светло-желтая
Глубина залегания глазков	поверхностная
Цвет кожуры	красный
Структура кожуры	сетчатая

Урожайность и качество

Назначение	столовый картофель
Урожайность	высокая
	45-60 т/га
Доля крупных клубней	выше средней, макс. 20%
Доля мелких клубней	низкая, 5 %
Развариваемость	преимущественно не разваривающийся
Потемнение при варке	слабое
Потемнение мякоти в сыром виде	слабое
Крахмалистость	ниже средней (12,6 %)

Оценка в баллах: 1 – очень плохо, 10 – очень хорошо

Вышеизложенная информация подготовлена на основании наших знаний и компетенций, но так как картофель является природным продуктом, мы не можем нести ответственность за конечный результат